

Краткие экофаунистические заметки

В.О. Козьминых (г. Пермь)

Первая и самая северо-восточная в Европейской России находка свиношки *Asiraca clavicornis* (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Cicadomorpha: Delphacidae) в Среднем Предуралье (Пермский край, г. Пермь)

V.O. Kozminykh. First, and the north-easternmost in European Russia, discovery of planthopper *Asiraca clavicornis* (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Cicadomorpha: Delphacidae) in the Middle Urals (Perm Territory, Perm City).
urn:lsid:zoobank.org:pub:310E5405-4C55-424E-A5F5-7D425FFFF3BD

В материале, собранном на территории природного ландшафта «Ивинский» в г. Перми, впервые в Среднем Предуралье обнаружена свиношка *Asiraca clavicornis* (Fabricius, 1794) (Delphacidae). Неожиданная находка этого вида с очень характерным и безошибочно узнаваемым обликом оказалась самой северо-восточной (58° с. ш., 56° в. д.) среди известных в Европейской России [Ануфриев, Егоров, 2016] и еще одной из наиболее северных местообитаний в Европе [Ødegaard, 2011].

До настоящего времени сведения о восточном пределе распространения южного субтрансевразийского *A. clavicornis* в европейской части страны ограничивались Нижегородской областью, Чувашией, Мордовией и Самарской областью [Ануфриев, Егоров, 2016]. Наиболее отдаленным к северо-востоку считалось указание этого вида из Пильнинского района Нижегородской области (окрестности с. Барятино, 55°23'N, 46°12'E) [Ануфриев, Егоров, 2016]. Обнаружение вида в г. Перми (Пермское Прикамье) продвигает известную границу намного дальше – более, чем на 800 км на северо-восток от точки в Нижегородской области, и является пока единственным свидетельством присутствия в Среднем Предуралье. Стоит при этом заметить, что на основании новых находок в центральной части Европейской России высказано предположение о «расселении вида по средней полосе во втором десятилетии XXI в.» [Алексанов, 2024: 49].

A. clavicornis широко, но спорадично распространен в странах Западной Европы [Nast, 1987]. Самое северное местонахождение отмечено в Норвегии на широте 59°29'N (окрестности г. Сельюр) [Ødegaard, 2011]. Встречается на Кавказе и в республиках Закавказья, а также в Казахстане, странах Центральной Азии и в Китае (цит. по: [Ануфриев, Егоров, 2016]). На юго-востоке Европейской России этот редкий вид найден в Саратовской области [Ануфриев, Егоров, 2016], а на Южном Урале известен по единичной находке из Оренбургской области (Саракташский район, с. Спасское – из коллекции Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге) [Галиничев, 2008; Немков, 2011].

Материал. *Asiraca clavicornis* (Fabricius, 1794) – Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, Садовый, природный ландшафт «Ивинский» (58°00'49.938"N, 56°18'56.688"E), суходольный луговой злаково-полюнно-разнотравный склон оврага южной экспозиции надпойменной террасы р. Ива, 116 м н. у. м., почвенные ловушки, 23.04–4.05.2023, 528 ловушко-суток, 1 ♂ (средняя динамическая плотность СДП, или «уловистость» 0,2 экз. на 100 ловушко-суток), 4–15.05.2023, 506 ловушко-суток, 1 ♀ (СДП 0,2 экз. на 100 ловушко-суток), 15.05–4.06.2023, 1000 ловушко-суток, 1 ♀ (СДП 0,1 экз. на 100 ловушко-суток), В.О. Козьминых leg. et det.

Следует отметить, что указанное местонахождение в г. Перми характеризуется также присутствием ряда других редко встречающихся видов Hemiptera из подотряда настоящих полужесткокрылых (Heteroptera) [Козьминых, 2023].

Литература. Алексанов В.В. 2024. Цикада *Asiraca clavicornis* (Fabricius, 1794) (Hemiptera, Delphacidae) в Калужской области // Полевой журнал биолога. Т. 6 (1). С. 42–51. – Ануфриев Г.А., Егоров Л.В. 2016. О северных пределах распространения в Европейской России, экологической и хорологической типологии свиношки *Asiraca clavicornis* (Fabricius, 1794) (Hemiptera, Cicadina, Delphacidae) // Тр. Мордов. гос. природ. зап-ка им. П.Г. Смидовича. Вып. 16. Саранск. С. 269–272. – Галиничев А.В. 2008. Цикадовые (Homoptera, Cicadina) фауны Урала в коллекции Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург) // Изв. Челябинск. науч. центра. Вып. 2 (40). С. 35–40. – Козьминых В.О. 2023. Новые находки полужесткокрылых (Heteroptera) на Урале // Эверсманния. Вып. 73. Тула. С. 11–36. – Немков В.А. 2011. Энтомофауна степного Приуралья (история формирования и изучения, состав, изменения, охрана). М.: Университетская книга. 316 с. – Nast J. 1987. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Europe // Ann. Zool. Vol. 40 (15). P. 535–661. – Ødegaard F. 2011. *Asiraca clavicornis* (Fabricius, 1794) (Homoptera, Delphacidae, Asiracinae) a new planthopper to northern Europe found in Norway // Norw. J. Entomol. Vol. 58. P. 33–35.