

Краткие номенклатурные заметки

С.К. Кorb (г. Бишкек, Киргизия)

Что такое *Drasteria pictoides* Poole, 1989 (Lepidoptera: Erebidae)?

S.K. Korb. **What is *Drasteria pictoides* Poole, 1989 (Lepidoptera: Erebidae)?**

urn:lsid:zoobank.org:pub:F6AD7D1B-6B54-41A0-94D8-3A83FEFACDF

1. В 1989 г. на страницах «Lepidopterorum Catalogus» было введено в научный оборот замещающее название *Drasteria pictoides* Poole, 1989 для разрешения первичной омонимии [Poole, 1989: 329–330]: «*pictoides* Poole *Drasteria*. NEW OBJECTIVE REPLACEMENT NAME. An objective replacement name for *Leucanitis picta* Staudinger 1877 (June), a junior primary homonym of *Leucanitis cailino* var. *picta* Christoph 1877 (January). Syntypes. Syria. [USSR]: South Caucasus, Helendorf [sic!]. [MNHU, Berlin] Synonym: *Leucanitis picta* Staudinger 1877 (preoccupied)».

2. В качестве типового материала данного таксона Р. Пулом ([Poole, 1989], см. выше) перечислены синтипы из Сирии и Хеленендорфа («Helendorf», lapsus calami, ныне город Гейгёль на территории Азербайджана); другие синтипы, перечисленные автором первоописания О. Штаудингером, Р. Пул по неизвестной причине не перечислил.

3. Типовой материал *D. pictoides*, согласно оригинальному описанию О. Штаудингера, включает 1 экземпляр из Сирии, 1 экземпляр из Хеленендорфа, 2 экземпляра из Краснодарска и большое количество экземпляров из степи между Астраханью и Сарептой: «Bereits in Lederer's Sammlung steckten von dieser neuen, der *Cailino* recht ähnlichen Art, zwei abgeflogene Stücke hinter *Cailino*: das eine aus Syrien, das andere, das grösste aller meiner vorliegenden Stücke, aus Helendorf (Süd-Caucasus). Später sandte mir Christoph zwei ♀♀ unter dem Namen *Picta* ein, die er bei Krasnowodsk am 5. und 15. Mai gefangen hatte. Es sind dies die kleinsten meiner vorliegenden Stücke. Im letzten Jahr nun erhielt ich eine grössere Anzahl dieser interessanten Art, die Herr Henke in einer Steppe zwischen Astrachan und Sarepta mit vier andern *Leucanitis*-Arten gefangen hatte» [Staudinger, 1877: 193] [«Уже в коллекции Ледерера было два экземпляра этого нового вида, очень похожего на *cailino*: один из Сирии, другой, самый крупный из всех имеющихся у меня экземпляров, из Хеленендорфа (Южный Кавказ). Позднее Христоф прислал мне две ♀♀ под названием *picta*, которых он поймал в Краснодарске 5 и 15 мая. Это самые маленькие из доступных мне экземпляров. В прошлом году я получил большое количество [экземпляров] этого интересного вида, которые г-н Хенке поймал в степи между Астраханью и Сарептой вместе с четырьмя другими видами *Leucanitis*»].

4. Включение в типовую серию *D. picta* (Staudinger, 1877) типовых экземпляров (синтипов) Г. Христофа показывает, что О. Штаудингер объективно описывал тот же таксон, что был описан как *D. picta* (Christoph, 1877), и даже сохранил название Г. Христофа.

5. Базируясь на той же серии экземпляров из степи между Астраханью и Сарептой, собранной Хенке (локалитет «Narün»), послужившей синтипами *D. picta* (Staudinger, 1877), О. Штаудингер описал таксон *D. picta radapicta* (Staudinger, 1901). Для таксона *radapicta* обозначен лектотип [Matov, Korb, 2019: 55].

6. Таким образом, серия синтипов *D. pictoides* Poole, 1989 включает типовую серию *D. picta* (Staudinger, 1877), часть типовой серии *D. picta* (Christoph, 1877) и типовую серию *D. picta radapicta* (Staudinger, 1901).

7. Для закрепления объективной синонимии названий О. Штаудингера и Г. Христофа и разрешения номенклатурной коллизии с типовой серией *D. pictoides*, состоящей из типовых серий трех таксонов, требуется обозначение номенклатурного типа *D. picta* (Staudinger, 1877). Для этого **обозначаем здесь лектотип *Leucanitis picta* Staudinger, 1877 (= *Drasteria pictoides* Poole, 1989)**, тот же экземпляр, который был обозначен нами как лектотип *Leucanitis cailino* var. *picta* Christoph, 1877 [Matov, Korb, 2019: 55], самка (ошибочно указана как самец при обозначении лектотипа *D. picta* (Christoph, 1877)), хранящаяся в Museum für Naturkunde Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Берлин, Германия, с этикетками: «Origin.» (печатная на розовой бумаге), «ex coll. 2/3 | Staudinger» (печатная, цифры рукописные, белая бумага), «Krasnow. | Christ.» (рукописная на желтой бумаге), «LECTOTYPUS ♀ | *Leucanitis cailino* var. *picta* | Christoph, 1877 | Horae Soc. ent. Ross. 12 (3): 257, (4) pl. 7, f. 28 | S. Korb et A. Matov det. 2019» (печатная на красной бумаге). К данным этикеткам будет добавлена печатная этикетка на красной бумаге «Lectotypus | *Leucanitis picta* | Staudinger, 1877».

8. *D. pictoides* был уже формально синонимизирован с *D. picta* (Christoph, 1877): «*Drasteria picta* (Christoph, 1877) (= *pictoides* Poole, 1989)» [Свиридов и др., 2006: 63].

9. Таким образом, поскольку названия *D. picta* (Staudinger, 1877) и *D. picta* (Christoph, 1877) основаны на одном и том же номенклатурном типе (лектотипе), название *D. pictoides* Poole, 1989 является младшим объективным синонимом старейшего пригодного названия для данного таксона: *D. picta* (Christoph, 1877) = *D. pictoides* Poole, 1989. Синонимия впервые установлена А.В. Свиридовым [Свиридов и др., 2006], однако не была номенклатурно обоснована, что мы и исправляем в данной заметке.

Литература. Свиридов А.В., Трофимова Т.А., Усков М.В., Муханов А.В., Лобкова Л.Е., Щуров В.И., Шутова Е.В., Кузнецов И.В., Ловцова Ю.А., Коржов П.Н., Окулов В.С. Клепиков М.А. 2006. Виды совок (Lepidoptera: Noctuidae s. l.), новые для различных регионов России. 2 // Эверсманния. Вып. 7–8. Тула. С. 46–68. — Matov A.Yu., Korb S.K. 2019. A revision of the genus *Drasteria* of Central Asia and Kazakhstan with special attention to the adjacent areas (Lepidoptera: Erebidae) // Zootaxa. Vol. 4673. 104 p. — Poole R. 1989. Lepidopterorum catalogus (New Series). Vol. 118. Noctuidae. Leiden. 1134 p. — Staudinger O. 1877. Neue Lepidopteren des europäischen Faunengebietes aus meiner sammlung // Stettiner Entomol. Ztg. Bd. 38 (4-6). S. 175–208.