Эверсманния. Энтомологические исследования в России и соседних регионах.
Вып. 87. 30.IX.2026: 46.

Eversmannia
No. 87. 2026

Краткие экофаунистические заметки

В.О. Козьминых (*г. Пермь)*

Новые находки жуков-горбаток (Coleoptera: Mordellidae) в Татарстане, Удмуртии и Пермском крае

V.O. Kozminykh. **New records of tumbling flower beetles (Coleoptera: Mordellidae) in Tatarstan Republic, Udmurt Republic and Perm Area.**
urn:lsid:zoobank.org:pub:7DA0A9A8-A1AB-4109-91CF-F978D9318E82

В дополнение к обзору фауны жуков-горбаток (Coleoptera: Mordellidae) Европейской России [Земоглядчук и др., 2020], а также в продолжение собственных работ по Mordellidae Урала и сопредельных территорий [Козьминых, 2019, 2022] привожу даные о новых находках 4 видов в Татарстане, Удмуртии и Пермском крае.

Материал. *Variimorda basalis* (A. Costa, 1854) – Татарстан, Мамадышский район, в 15 км ЮЗ г. Мамадыш, окр. с. Средние Кирмени (55°40'05"N, 51°12'35"E), опушка березняка с осиной около шоссе, разнотравная поляна, кошение по растительности, 19.06.2026, 1 ♂, В.О. Козьминых leg. et det. Удмуртия, Воткинский р-н, в 4 км З г. Воткинск, в 2 км З д. Двигатель (57°00'11"N, 53°51'21"E), опушка сосново-березового леса, злаково-разнотравный луг вдоль шоссе Ижевск – Воткинск, кошение по растительности, 22.06.2026, 4 ♂♂, В.О. Козьминых leg. et det. Европейский вид. В европейской части России известен из Московской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Ульяновской, Саратовской областей и Краснодарского края [Земоглядчук и др., 2020]. Впервые приводится для Татарстана и Удмуртии.

Mordellistena (s. str.) *brevicauda* (Bohemann, 1849) – Татарстан, Мамадышский район, в 15 км ЮЗ г. Мамадыш, окр. с. Средние Кирмени, опушка березняка с осиной около шоссе, разнотравная поляна, кошение по растительности, 19.06.2026, 1 ♀, В.О. Козьминых leg. et det. Трансевразиатский вид. В Европейской России известен из Воронежской, Белгородской, Астраханской, Самарской, Саратовской областей, Удмуртской Республики и Республики Адыгея [Земоглядчук и др., 2020]. Впервые приводится для Татарстана. Для Удмуртии был указан без точного местонахождения в работе [Дедюхин и др., 2005]. Приводится *дополнительный материал* новой конкретной находки в Удмуртии: Воткинский р-н, в 4 км З г. Воткинск, в 2 км З д. Двигатель, опушка сосново-березового леса, злаково-разнотравный луг вдоль шоссе Ижевск – Воткинск, кошение по растительности, 22.06.2026, 1 ♂, В.О. Козьминых leg. et det.

Mordellistena (s. str.) *reichei* Emery, 1876 – Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон Чапаевский, долина р. Балмошная (58°04'24"N, 56°21'37"E), злаково-полынно-разнотравный луг с шиповником на крутом надпойменном юго-западном склоне холма, почвенные ловушки, 12.05–8.06.2026, 216 ловушко-суток, 1 ♂ (уловистость 0,5 экз. на 100 ловушко-суток), В.О. Козьминых leg. et det. Европейский вид. В Европейской России ранее был известен только из 2 областей: Белгородской и Самарской (нац. парк «Самарская Лука») [Земоглядчук и др., 2020]. Впервые приводится для Пермского края и Уральского региона в целом. Указанное место находки (г. Пермь) отдалено на 850 км к северо-востоку от Самарской Луки и может считаться самым северо-восточным в европейском ареале вида.

Mordellochroa humerosa (Rosenhauer, 1847) – Пермский край, Добрянский р-н, окр. д. Гари (58°08'44"N, 56°34'50"E), опушка сосняка травяного, полынно-злаковый луг, кошение по разнотравью, 7.08.2024, 1 ♂, В.О. Козьминых leg. et det. Трансевразиатский вид. В европейской части страны ранее был известен из Тамбовской, Воронежской, Тульской и Ульяновской областей [Земоглядчук и др., 2020]. Впервые приводится для Пермского края и Уральского региона. Местонахождение в Перми отдалено на 900 км к северо-востоку от с. Васильевка Ульяновской области, где был обнаружен *M. humerosa* [Исаев, Ковалев, 2003], и является наиболее северо-восточным в европейской части ареала вида.

Примечание по Mordellidae. Дополняя сведения о горбатках Урала, следует отметить, что для Башкортостана недавно был указан *Mordella holomelaena* Apfelbeck, 1914 [Хабибуллин, 2025], ранее не зарегистрированный в республике. Таким образом, на Урале по обновленным данным с учетом представленного материала встречается 23 вида Mordellidae (в Пермском крае 11 видов, в Башкортостане 9 видов). В Татарстане теперь стало известно 9 видов [Земоглядчук и др., 2020 (7 видов)], а в Удмуртии 16 видов [Земоглядчук и др., 2020 (10 видов); Дедюхин и др., 2005 (15 видов)].

Литература. Дедюхин С.В., Никитский Н.Б., Семёнов В.Б. 2005. Систематический список жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Удмуртии // Евразиат. энтомол. журнал. Т. 4 (4). С. 293–315. – Земоглядчук А.В., Ручин А.Б., Егоров Л.В. 2020. Аннотированный список горбаток (Coleoptera, Mordellidae) Республики Мордовия с кратким обзором изученности семейства в европейской части России // Зоол. журнал. Т. 99 (6). С. 641–655. – Исаев А.Ю., Ковалев А.В. 2003. Предварительный эколого-фаунистический обзор жуков-горбаток (Coleoptera, Mordellidae) Ульяновской области // Природа Симбирского Поволжья. Вып. 4. Ульяновск. С. 89–91. – Козьминых В.О. 2019. Современное состояние изученности фауны жуков-горбаток (Coleoptera: Mordellidae) Урала // Эверсманния. Вып. 57. Тула. С. 18–24. – Козьминых В.О. 2022. Новые находки жесткокрылых (Coleoptera) на Урале // Там же. Вып. 71–72. С. 27–46. – Хабибуллин В.Ф. 2025. Материалы по фауне клопов и жуков (Insecta: Heteroptera, Coleoptera) спортивно-оздоровительной базы «Авиатор» УУНиТ (сборы 2024 года) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. Вып. 47. Уфа. С. 32–37.