

Л.В. Большаков (г. Тула), М.Н. Цуриков (Липецкая обл., Задонский р-н, с. Донское)

К фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Воронежской области

L.V. Bolshakov, M.N. Tsurikov. **On the fauna of Lepidoptera of Voronezh province.**
urn:lsid:zoobank.org:pub:6B8AAEBC-1E98-4CAF-BD18-CABBF7DF742B

В результате изучения ватных сборов, хранящихся в коллекции заповедника «Галичья Гора», Л.В. Большаковым был определен материал по разноусым чешуекрылым, включающий не менее 4 новых видов для Воронежской области, в т. ч. 1 новый для Центрального Черноземья («регион №9» в «Каталоге чешуекрылых России» [2008]). Степень новизны для фауны области определялась с учетом критического анализа данных, опубликованных в «Кадастре беспозвоночных животных Воронежской области» [Водянов и др., 2005]. Эти данные (без учета явных ошибок) принимаются нами как базовые для Воронежской области по булавоусым чешуекрылым и «бомбикоидному комплексу», тогда как представленные списки пядениц и совок не могут быть приняты без серьезного анализа публикаций предшественников и просмотра фактического материала, а списки микрочешуекрылых к тому же очень неполны.

Исследованный материал собран М.Н. Цуриковым в Воронежской области: 30 км Ю. Острогоска, с. Кривая Поляна (50°38'56.8"N, 39°08'52.9"E), 20-24.08.2001. Местонахождение находится в степной зоне, включает, помимо агроландшафта, степные склоны и посадки различных древесно-кустарниковых пород. Новые для области виды отмечены знаком (*), новый для Центрального Черноземья – знаком (**), подтвержденные для фауны после ненадежных предыдущих указаний – знаком (+). В аннотациях видов даются только точные даты сборов, число экземпляров и необходимые комментарии.

Pyraustidae

**Evergestia extimalis* (Scopoli, 1763) – 20.08.2001, 1 экз. Вид не отмечался для «региона №9» в «Каталоге...» [2008], позднее был найден в Липецкой области [Большаков, Мазуров, 2010].

***Evergestia limbata* (Linnaeus, 1767) – 23.08.2001, 1 ♀. Вид был известен не ближе Среднего Поволжья [«Каталог...», 2008].

Drepanidae

**Cilix glaucata* (Scopoli, 1763) – 21-22.08.2001, 2 экз.

Geometridae

+*Peribatodes rhomboidaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 21-24.08.2001, 3 ♂♂, 1 ♀. Этот сложный для определения вид был указан для области [Водянов и др., 2005: 353] два раза подряд, в т. ч. как «*promboidaria*» [sic!], по двум непроверенным «сообщениям» (явно без учета современных пособий и генитальных признаков).

+*Eupithecia innotata* (Hufnagel, 1767) – 23.08.2001, 1 ♂. Этот сложный для определения вид был указан [Водянов и др., 2005: 349] со ссылкой на работу (Положенцев, Негроров, 1980), авторы которой не лепидоптерологи, тогда как определение по внешности в то время не могло быть надежным.

**Idaea seriata* (Schrank, 1802) – 23.08.2001, 1 ♀.

Кроме того, в исследованном материале оказались следующие ранее известные из области по заслуживающим доверия работам, а также впервые указанные в «Кадастре...» [Водянов и др., 2005] и принятые нами виды пядениц: *Chiasmia clathrata* (Linnaeus, 1758) – 23.08.2001, 1 экз.; *Isturgia murinaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 21.08.2001, 1 экз.; *Thetidia smaragdaria* (Fabricius, 1787) – 23.08.2001, 1 экз.; *Camptogramma bilineata* (Linnaeus, 1758) – 20.08.2001, 1 экз. (был ранее указан лишь по «сообщ. Д.В. Дубровского», принимается в связи с обычностью и легкостью определения по внешности); *Xanthorhoe fluctuata* (Linnaeus, 1758) – 23-24.08.2001, 3 экз. (был указан аналогично, принимается в связи с относительной обычностью и легкостью определения по внешности); *Epirrhoe galiata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 23.08.2001, 1 экз.; *E. alternata* (Müller, 1784) – 20.08.2001, 1 экз.; *Pelurga comitata* (Linnaeus, 1758) – 23.08.2001, 1 экз.; *Aplocera plagiata* (Linnaeus, 1758) – 21.08.2001, 1 экз.; *Idaea straminata* (Borkhausen, 1794) – 20-23.08.2001, 4 ♀♀; *Scopula ornata* (Scopoli, 1763) – 23.08.2001, 2 экз.; *Scopula rubiginata* (Hufnagel, 1767) – 20-21.08.2001, 3 экз.; *Timandra comae* A. Schmidt, 1931 – 23.08.2001, 1 экз. (был ранее приведен как *T. griseata* (Pat. [sic!], 1902), это название сейчас относится к самостоятельному более северному виду-двойнику).

Работа выполнена при поддержке заповедника «Галичья Гора» Воронежского государственного университета.

Литература. Большаков Л.В., Мазуров С.Г. 2010. К фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Липецкой области // Вестник Мордов. ун-та. №1. Сер. «Биологические науки». Саранск. С. 4–15.– Водянов К.Ю., Дубровский Д.В., Негроров О.П., Рябчинская Т.А., Селиванова О.В. 2005. Отряд Lepidoptera // Кадастр беспозвоночных животных Воронежской области. Воронеж. С. 328–400. – Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России. 2008. Ред. Синёв С.Ю. СПб.– М. 424 с.