Эверсмания. Энтомологические исследования
Eversmanni
а
в Европейской России и соседних регионах
Вып. 2. 20.X.2005 No. 2. 2005

Краткие экофаунистические заметки

С. Ю. Синёв (*г. Санкт-Петербург*), Л. В. Большаков (*г. Тула*)

Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901 (Lepidoptera: Phycitidae) — новый для Европейской России вид узкокрылой огневки

S. Yu. Sinev, L. V. Bolshakov. ***Nyctegretis triangulella* Ragonot, 1901 (Lepidoptera: Phycitidae) — the new species of European Russia**

При определении микрочешуекрылых, собранных О. А. Полумордвиновым и С. В. Шибаевым в Пензенской области, был выявлен малоизвестный (отсутствующий в отечественных определителях фауны европейской части СССР) вид узкокрылой огневки — *Nyctegretis triangulella* Ragonot, 1901, оказавшийся новым не только для региона, но и для Европейской России. Данный вид является двойником широко распространенного и обычного *N. lineana* (Scopoli, 1763), от которого он надежно отличается строением гениталий обоего пола [Kasy, 1975: Abb. 2,5; Кирпичникова, Яманака, 1999: 488–490, рис. 287–3,4,7; 288–4]. Ранее этот вид был известен в ряде стран Южной и Центральной Европы — Италии, Греции, Румынии, Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии [Speidel, Ganev, 1996], Юго-Восточной Украине (в Донецкой и Луганской областях) [Пак, 1998], а также — Дальнем Востоке России, Корее, Китае, Японии [Кирпичникова, Яманака, 1999].

Материал. Пензенская обл., д. Новая Есинеевка, 53°15' с. ш. 43°47' в. д., на свет ДРЛ, 23.07.2004, 1♂ (О. Полумордвинов) (опр. С. Синёв); окрестности Пензы, Ахуны, на УФ свет, 30.06.2004, 1♂ (С. Шибаев) (опр. Л. Большаков). Оба экземпляра в сильно облетанном состоянии, в настоящее время хранятся в Тульском областном экзотариуме.

Местонахождения вида находятся на самом юге лесной и севере лесостепной зон, где (по данным сборщиков материала) представлены самые разнообразные биотопы, в том числе лиственные леса и посадки, сосновые посадки, разнотравные сырые и остепненные луга (особенно богатые в Новой Есинеевке), антропогенные пустыри и поля, а также прибрежные ольшаники, ивняки и травянистые формации.

Авторы выражают благодарность сборщикам материала О. А. Полумордвинову и С. В. Шибаеву (г. Пенза).

Литература. Кирпичникова В. А., Яманака Х. 1999. 11. Подсем. Phycitinae // Опред. насекомых Дальнего Востока России. Т. 5. Ручейники и чешуекрылые. Ч. 2. С. 443–496.— Пак О. В. 1998. Материалы по новым для фауны Юго-Востока Украины видам огневок (Lepidoptera; Pyraloidea) // Изв. Харьков. энтомол. общества. Т. 6, вып. 2. С. 70–73.— Kasy F. 1975. Korrekturen und Bemerkungen der Gattung Nyctegretis Zeller in Microlepidoptera Palaearctica, Bd. 4 (Lepidopt., Pyralidae, Phycitinae) // Zeitschr. Arbeitsgem. Цsterr. Entomol. 26 Jg. (1974), Hf. 1–2. S. 51–60.— Speidel W., Ganev Yu. 1996. Family Pyralidae // The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist. Stenstrup: Apollo Books. P. 166–196.