

В. П. Лосманов (г. Чебоксары), Л. В. Большаков (г. Тула)

Два новых вида пестрянок (Lepidoptera: Zygaenidae) для Чувашии

V. P. Losmanov, L. V. Bolshakov. Two new species of the burnet moths (Lepidoptera: Zygaenidae) for Chuvashia

При обследовании В. П. Лосмановым в июле 2005 г. ряда остепненных биотопов в Чебоксарском, Цивильском и Яльчикском районах Чувашской республики были собраны 2 очень локальных вида пестрянок, ранее не отмеченных для фауны этого региона [Ластухин и др., 1998; Ластухин, 2003; Большаков, Лосманов, 2005]. Проверка правильности определения материала проведена Л. В. Большаковым.

Материал.

Zygaena loti ([Denis et Schiffermüller], 1775) (= *achilleae* (Esper, 1780) — Чебоксарский р-н: Хыркасы, 7.07.2005, 12 экз.; Абашево, 9.07.2005, 3 экз.; Челкасы — Акулево, 12.07.2005, 3 экз.; Цивильский р-н: Табанары — Тувси, 10.07.2005, 5 экз.; Яльчикский р-н: Эшмикеево (Сурковый заказник), 13.07.2005, 5 экз.

Zygaena angelicae Ochseneheimer, 1808 — Чебоксарский р-н: Хыркасы, 7.07.2005, 4 экз.; Челкасы — Акулево, 12.07.2005, 2 экз.; Цивильский р-н: Табанары — Тувси, 10.07.2005, 4 экз.

Местообитания этих видов — малонарушенные остепненные склоны южной экспозиции (в большинстве случаев над руслами малых рек, в данном случае — Рыкши и Пожанарки) с доминированием вяза разноцветного (*Coronilla varia* L.) — основного или даже единственного кормового растения гусениц этих пестрянок в средней полосе Европейской России. Наиболее заметными членами консорциев вяза разноцветного являются также пестрянка *Z. ephialtes* (L., 1767), голубянки *Polyommatus coridon* (Poda, 1761) и *P. daphnis* ([Den. et Schiff.], 1775).

Места сбора материала: Абашево — 17–18 км ЮЮВ Чебоксар; Хыркасы — 19 км ЮЮВ Чебоксар; Челкасы, Акулево — 22 км ЮВ Чебоксар; Табанары, Тувси — 4–5 км С райцентра Цивильск; Эшмикеево — 16–17 км ЮЮЗ райцентра Яльчики.

Указанные виды со временем должны быть обнаружены в большинстве вязельников данного региона, занимающих площадь более 5 га. Однако вероятность наличия таких сообществ значительно снижается на правобережье р. Волги, в подзоне южной тайги.

Литература. Большаков Л. В., Лосманов В. П. 2005. Новые данные о фауне пестрянок (Lepidoptera: Zygaenidae) Чувашии // Эверсманния. Энтомологические исследования в Европейской России и соседних регионах. Вып. 1. С. 26–27.— Ластухин А. А., Иванов А. В., Лосманов В. П. 1998. К фауне и фенологии разноусых чешуекрылых (Lepidoptera, Bombyces et Sphinges) Чувашской республики // Энтомологические исследования в Чувашии. Мат. 1-й республ. энт. конф. Чебоксары. С. 71–77.— Ластухин А. А. 2003. К фауне бабочек Козловского района Чувашской республики // Экологический вестник Козловского района. Вып. 1. Чебоксары. С. 41–44.