Эверсманния. Энтомологические исследования
в России и соседних регионах.
Вып. 7–8. 25.XII.2006: 25–26

Eversmannia
No. 7–8. 2006.

Экология и фаунистка

Л.В. Егоров
г. Чебоксары, Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева (кафедра зоологии и экологии)

Дополнение к фауне жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) Чувашии

L.V. Egorov. **Addition on the fauna of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Chuvashia.**

SUMMARY. The addition to the list of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Chuvashia is given. The new information on 5 species is resulted. *Molorchus (Glaphyra) umbellatarum* (Schreb.) is not listed. *Molorchus (Glaphyra) marmottani* Bris. and *Purpuricenus globulicollis* Muls. are listed for the Chuvachia for the first time.

Систематический список Cerambycidae Чувашии опубликован нами ранее [Егоров, 2005]. В настоящем сообщении приводятся новые данные по фауне жуков-усачей республики, основанные на результатах переопределения ряда видов и обработки некоторых новых материалов. Новые для республики виды помечены звездочкой (*).

Rutpela maculata (Poda, 1761) — Комсомольский район, окр. с. Асаново, лето 2005, 1 экз., Карсуков А.В. Находка представляет интерес для уточнения распространения вида в пределах Чувашии. К настоящему времени он известен только из южной половины республики (Алатырский, Порецкий, Шемуршинский, Комсомольский, Ибресинский и Канашский районы).

Trichoferus campestris (Faldermann, 1825) — г. Чебоксары, 02.07.2005, на лету у магазина, 1 экз., Карпеев С.А. Это вторая находка вида в пределах города [Егоров, 2005]. Вероятно, экземпляр завезен с какими-то древесными материалами.

**Molorchus (Glaphyra) marmottani* Brisout, 1863 — указание для Чувашии *Molorchus (Glaphyra) umbellatarum* (Schreber, 1759) [Егоров, 1998, 2005] основывалось на ошибочном определении этого вида. Чувашия, Заволжье, 2,5 км N г. Чебоксары, 55 квартал Акшкюльского лесничества, 19.06.1996, сосняк, кошение под пологом леса по травянистой растительности и кустарникам, 1 экз. (♀), Егоров Л.В. (det. M.L. Danilevsky). В Среднем Поволжье вид был отмечен из Ульяновской [Исаев, Ишутов, 2001] и Самарской [Исаев, Магдеев, 2003; Исаев и др., 2004] областей.

Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) — г. Чебоксары, 06.07.2006, опушка дубравы, на листе *Aegopodium podagraria* L., 1 экз., Кириллова В.И. По устному сообщению М.Л. Данилевского, основанному на изучении материала, указание вида для Государственного природного заповедника «Присурский» [Егоров, 2000] ошибочно.

**Purpuricenus globulicollis* Mulsant, 1839 — Алатырский район, 1,5 км S с. Атрать, Государственный природный заповедник «Присурский», опушка 56 и 35 кварталов, 16.07.1999, на лету, 1 экз., Егоров Л.В. (det. M.L. Danilevsky). Жук летел по просеке между названными кварталами на расстоянии не менее 30 м от леса. Вероятно, развитие происходило в 56 квартале, где представлены преимущественно лиственные породы — осина, ольха, береза, вяз. В 35 квартале — сосново-еловые ассоциации с примесью лиственных пород. Находка вида — первая для территории Чу-

вашии и Среднего Поволжья. Для России, по устному сообщению М.Л. Данилевского, вид впервые отмечен из Оренбургской области [Шаповалов и др, 2006]. Одно из указаний *P. kaehleri* (L.) [Егоров, 2000] для Чувашии ошибочно и относится именно к этому виду.

С учетом данных настоящей публикации, из списка жуков-усачей Чувашии [Егоров, 2005] исключается 1 вид — *Molorchus (Glaphyra) umbellatarum* (Schreber, 1759). В состав семейства включаются 2 вида — *Molorchus (Glaphyra) marmottani* Brisout, 1863 и *Purpuricenus globulicollis* Mulsant, 1839. Общее число достоверно известных с территории Чувашии Cerambycidae составляет, таким образом, 103 вида.

Автор искренне признателен М.Л. Данилевскому (Москва) за помощь в определении некоторых видов и информационную поддержку; членам Чувашского отделения РЭО В.И. Кирилловой и С.А. Карпееву (Чебоксары) за предоставление на обработку интересного материала.

Литература

Егоров Л.В. 1998. Особенности фауны жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) природного парка «Заволжье» // Экологический вестник Чувашской Республики. Вып. 19. Чебоксары. С. 64–65.

Егоров Л.В. 2000. Жесткокрылые (Insecta, Coleoptera) государственного природного заповедника «Присурский» и его охранной зоны. 2. Предварительный список видов // Научные труды ГПЗ «Присурский». Т. 3. Чебоксары: Атрат. С. 44–49.

Егоров Л.В. 2005. Жуки-усачи (Coleoptera: Cerambycidae) Чувашской Республики: систематический список видов // Эверсманния. Энтомологические исследования в Европейской России и соседних регионах. Вып. 2. Тула. С. 9–23.

Исаев А.Ю., Егоров Л.В., Егоров К.А. 2004. Жесткокрылые (Insecta, Coleoptera) лесостепи Среднего Поволжья. Каталог. Ульяновск: Изд-во УлГУ. 72 с.

Исаев А.Ю., Ишутов А.Л. 2001. Дополнение к фауне жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) Ульяновской области // Научные труды ГПЗ «Присурский». Т. 7. Чебоксары: Атрат. С. 86–91.

Исаев А.Ю., Магдеев Д.В. 2003. Фауна жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) лесостепной зоны Поволжья // Исследования в области биологии и методики ее преподавания. Межвуз. сб. науч. тр. к 100-летию Д.Н. Флорова. Вып 3. Ч. 1. Самара. С. 290–300.

Шаповалов А.М., Немков В.А., Русаков А.В., Шовкун Д.Ф. 2006. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) Оренбургской области // Вестник Оренбургского государственного университета. № 4 (54). Оренбург: Изд-во ОГУ. С 105–109.

Поступила в редакцию 28.08.2006

РЕЗЮМЕ. Дано дополнение к списку жуков-усачей (Cerambycidae) Чувашии. Приводится новая информация о 5 видах. *Molorchus (Glaphyra) umbellatarum* (Schreb.) исключается из списка. *Molorchus (Glaphyra) marmottani* Bris. и *Purpuricenus globulicollis* Muls. для Чувашии приводятся впервые. Библ. 7.