

Краткие экофаунистические заметки

Л.В. Большаков (г. Тула)

Epiblema obscuranum (Herrich-Schäffer, 1851) (Lepidoptera: Tortricidae) — новый вид фауны России

L.V. Bolshakov. *Epiblema obscuranum* (Herrich-Schäffer, 1851)
(Lepidoptera: Tortricidae) — the new species of the fauna of Russia.

При дальнейшей обработке микрочешуекрылых, собранных в Тульской области, был выявлен вид листовертки, оказавшийся новым для фауны России — *Epiblema obscuranum* (Herrich-Schäffer, 1851). Этот европейский суббореальный вид ранее был указан не западнее Финляндии, Литвы — Болгарии [Razowski, 1996, 2003], а в коллекции Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) представлен также из Украины (Крым).

Материал. «Тульская обл., Козье, 24 км СВ Ефремова [Tula Area, Koz'e, 24 km NO Efremov] 3.06.2006», 1♀ (leg. Л.В. Большаков) (опр. он же). Экземпляр в умеренно облетанном состоянии, по внешним признакам и гениталиям полностью соответствует описанию вида в цитируемой сводке. Хранится в Зоологическом институте РАН.

По внешним признакам данный вид очень трудно различим с мелкими экземплярами обычного и повсеместно распространенного в области *E. scutulanum* ([Den. et Schiff.], 1775), по гениталиям самцов — с рядом близких видов, а по гениталиям самок — с пока неизвестным здесь *E. junctanum* (H.-S., 1856), имеющим довольно характерную внешность. По литературным данным, вид трофически связан с девясилом иволистным (*Inula salicina* L.), широко распространенным в нашем регионе.

Местонахождение вида — на севере подзоны типичной лесостепи, на сильно остепненном склоне площадью около 200 га. Здесь имеются 2 компактных памятника природы — «Конь-камень» (0,8 га) и «Участок ковыльной степи ...» (15 га) [Шереметьева и др., 2007]. Однако неоднократно публиковались предложения расширить ООПТ, включив в нее весь особо ценный биогеокомплекс. Ранее здесь было собрано много очень локальных или редких видов чешуекрылых лугово-степного комплекса, в том числе на северной границе ареала или в экстразональных изолятах. Для установления статуса *E. obscuranum* в условиях региона и России в целом необходимы более репрезентативные сборы видов-двойников.

Автор сердечно благодарит С.Ю. Синёва и С.В. Недошивину (Зоологический институт РАН) за помощь в поиске необходимой литературы и работе с фондовой коллекцией.

Литература. Шереметьева И.С., Большаков Л.В., Лакомов А.Ф. 2007. 16. Участок ковыльной степи у с. Козье // Красная книга. Особо охраняемые природные территории Тульской области. Тула. С. 59–61. — Razowski J. 1996. Family Tortricidae // The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist. Stenstrup. P. 130–157. — Razowski J. 2003. Tortricidae (Lepidoptera) of Europe. 2. Olethreutinae. Bratislava. 301 p.