Рецензия на книгу

**A. Schintlmeister, A. Pinratana. Moths of Thailand. Vol. Five. Notodontidae.—
Bangkok, 2007.— 320 pp., 45 pls.**

Новая книга серии «Чешуекрылые Таиланда» — третья за последние 2 года — посвящена хохлаткам. Ее авторы хорошо известны и признаны в энтомологических кругах. Заявленные как иллюстрированные каталоги различных групп чешуекрылых Таиланда, книги указанной серии на самом деле оказывают огромную помощь в определении бабочек Ориентальной фауны вообще. Для многих групп они оказываются первыми как фаунистическими, так и таксономическими сводками, дающими возможность обработать сборы из многих сопредельных регионов. Научный и полиграфический уровень книг серии «Чешуекрылые Таиланда» резко возрос за последние три года, что дает им возможность встать в один ряд с известной серией «Moths of Borneo». Рецензируемая книга была полностью подготовлена к изданию Александром Шинтльмайстером, автором нескольких монографий (фаун Палеарктики, Китая, Вьетнама) и многих сводок по хохлаткам, а спонсирована Амнуи Пинратаной.

Новая книга построена, в принципе, по принятой в этой серии схеме. За короткими «Introduction» и «Material and Acknowledgements» следует небольшая, но насыщенная картами глава «The fauna of Thailand's Notodontidae», в которой показаны особенности географического распространения хохлаток и центры эндемизма на рассматриваемой территории. За этой главой дается «Check-list of Thailand's Notodontidae», в котором в систематическом порядке приводится список тайских хохлаток, насчитывающий 8 подсемейств, 96 родов и 285 видов. Следующая далее «Systematic and faunistic part» представлена развернутыми видовыми очерками, в которых для каждого вида приводится следующая информация: название вида с указанием типового местонахождения (без цитат первоописаний) и музеев хранения типового материала; полный перечень синонимов; в разделе «Diagnosis» даны диагностические признаки каждого таксона; в разделе «Bionomics» — биотопические предпочтения таксона и известные данные по его биологии, прежде всего, по кормовым растениям, фенологии и зимующим стадиям; в разделе «Distribution» — сведения по общему распространению вида и, иногда, более детальные по его встречаемости в Таиланде. Для некоторых видов введен специальный раздел «Taxonomic note», в котором обсуждаются сложные таксономические проблемы, обосновывается устанавливаемая новая синонимика или производится обозначение лектотипов. Для видов, сложно отличающихся по внешним признакам, в очерках даются черно-белые фотографии генитальных структур, обычно с указателями в виде линий, направленных на диагностически важные признаки.

Продолжает систематическую часть иллюстративный материал. Он представлен 45 цветными таблицами с изображениями бабочек обоего пола, сопровождаемых иногда специальными стрелочками, указывающими на диагностически важные признаки морфологии или рисунка. Часть таблиц (41-45) посвящена изображениям бабочек в покое и их гусениц.

Завершают книгу библиографический список («References») и список произведенных таксономических изменений («Taxonomic changes»). Из последних необходимо отметить описание 2 новых подродов, 35 новых видов, 13 новых подвидов, установление 15 новых комбинаций, 12 новых родовых и 15 видовых синонимов, а также пересмотр и ревизия статуса 11 таксонов.

К сожалению, при написании или при подготовке книги к печати не удалось избежать некоторых промахов. Основная из них — отсутствие индекса видовых и родовых названий, из-за чего поиск текстовой части по нужному виду может затянуться надолго. Более мелкие — достаточно часто встречающиеся досадные опечатки (типа «*ccommatus*» вместо «*comatus*» (рис. 141 на табл. 43) или приведение в списке синонимов таксона «Subgenus *Torona* Walker, 1865» (с. 319) без указания произведенных над ним операций). Но наиболее досадным и прежде всего бросающимся в глаза является несколько небрежная допечатная обработка снимков, при которой вы-

резание отдельных изображений для помещения их на единый фон сделано так, что части бахромок и антенн бабочек в получившемся изображении оказываются явственно «слипшимися» из-за оставшегося старого фона.

Однако эти недостатки не снижают ценности данной книги. Расширившаяся за последние два десятилетия возможность пополнения коллекций представителями Индо-Малайской фауны настоятельно диктует необходимость издания определителей, атласов и руководств по различным группам микро- и макрочешуекрылых Юго-Восточной Азии. Чрезвычайно отраднo, что серия «Чешуекрылые Таиланда» дает возможность работы хотя бы с наиболее яркими группами. Вместе с тем, в данной серии в ближайшее время планируется издать аналогичные обзоры по медведицам (Arctiidae), пестрянкам (Zygaenidae, прежде всего Chalcosiinae), вторую книгу по совкам (Noctuidae) и переиздание в свете накопленной за прошедшие 20 лет новой информации тома по сатурниям (Saturniidae). Хочется надеяться, что увидят свет и задуманные монографии по древооточам (Cossidae), эуптеротидам (Eupterotidae) и настоящим шелкопрядам (Bombycidae), тем более, что имеющиеся материалы позволяют их сделать на высоком уровне и в самое ближайшее время.

В. В. Золотухин
(Ульяновский государственный педагогический университет)