

Е.В. Цветков
г. Санкт-Петербург

Материалы к познанию пядениц (Lepidoptera: Geometridae) Северного Кавказа с указанием нового для фауны России вида

E.V. Tsvetkov. Contribution to the geometrid moths fauna (Lepidoptera: Geometridae) of the Northern Caucasus with reporting a new species for the fauna of Russia.

Весной и летом 2008 г. автором проводились сборы чешуекрылых в Краснодарском и Ставропольском краях. Определение материала проводилось автором по специальным работам [Mironov, 2003; Hausmann, 2004]. Правильность определения пядениц рода *Eupithecia* Curtis, 1825 была проверена В.Г. Мироновым (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург), за что автор выражает ему искреннюю благодарность. В результате обнаружены виды, ранее не указанные для Кавказа, а также один новый вид для фауны России (ниже отмечен знаком *). Материал хранится в коллекции автора и частично в Зоологическом институте РАН (Санкт-Петербург).

**Eupithecia oxycedrata* (Rambur, 1833): Краснодарский кр., п-ов Абрау, W окр. пос. Варваровка [NW Caucasus, Krasnodar Territory, Abrau Peninsula, Varvarovka], 3.V.2008, 1♂, 1♀. Оба экземпляра взяты на свет на дне щели (щель Марусенкова) в широколиственном лесу, поблизости от сухих лугово-степных биотопов (можжевеловые редколесья, щебнистые степные склоны).

Этот средиземноморский вид до сих пор был известен с Крымского полуострова [Миронов, 1988], а также из Турции [Mironov, 2003].

Eupithecia pernotata Guenée, 1858: Ставропольский кр., г. Бештау [N Caucasus, Stavropol Territory, Beshtau mnt.], 15–19.VI.2008, 4♂♂, 3♀♀. Найден на субальпийских крупнотравных лугах на высоте около 1200 м.

Idaea subsericiata (Haworth, 1809): Краснодарский кр., п-ов Абрау, W окр. пос. Варваровка [NW Caucasus, Krasnodar Territory, Abrau Peninsula, Varvarovka], 3–21.V.2008, 16♂♂, 2♀♀. На полуострове Абрау лёт первого поколения наблюдался с первых чисел мая до начала июня. Бабочки были нередки на остепнённых закустаренных склонах.

Вид до сих пор не был известен на Кавказе. Приводился для Крымского полуострова, Закавказья, Малой Азии, Средней Азии, Средиземноморья, юга европейской части России [Viidalepp, 1996; Hausmann, 2004]. Найден также в Астраханской области, где до сих пор не отмечался (оригинальные данные: Астраханская область, пески Досанг, 6.VIII.2008, 1♀, leg. Боязитов К.Ф.).

Литература. Миронов В.Г. 1988. Материалы к фауне пядениц рода *Eupithecia* (Lepidoptera, Geometridae) Крыма с описанием нового вида. // Вестник зоологии. № 4. С. 15–21. — Hausmann A. 2004. Sterrhinae / The Geometrid Moths of Europe. Vol. 2. Stenstrup: Apollo Books. 600 p. — Mironov V. 2003. Larentiinae II (Perizomini and Eupitheciini) / Ibid. Vol. 4. 463 p. — Viidalepp J. 1996. Checklist of the Geometridae (Lepidoptera) of the former U. S. S. R. Stenstrup: Apollo Books. 111 p.